

ظلل (اختر) الإجابة الصحيحة مما يلي:

(1) باستخدام توزيع ذي الحدين فإن احتمال الحصول على 4 صور في 6 رميات لعملة متوازنة يساوي:

- (أ) 0.194
 (ب) 0.214
 (ج) 0.234 **المحاضرة الرابعة 35**
 (د) 0.254

إذا أجريت دراسة بين عدد من المتغيرات وكانت مخرجات هذه الدراسة بعد تحليل بياناتها من خلال برنامج الـ SPSS كالتالي:

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances	t-test for Equality of Means								
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
الراتب	Equal variances assumed	4.880	.040	.709	18	.488	4.700	6.633	-9.23471	18.63471
	Equal variances not assumed			.709	15.05	.489	4.700	6.633	-9.43323	18.83323

(2) من خلال البيانات السابقة، فإن القرار النهائي باختبار الفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين هو:

- (أ) رفض الفرضية الصفرية
 (ب) قبول الفرضية البديلة
 (ج) **قبول الفرضية الصفرية** **المحاضرة الحادية عشر الجزء (2) 98**
 (د) عدم القدرة على اتخاذ أي قرار

(3) اختبار **one sample t test** من ضمن الاختبارات المعلمية، وأحد استخداماته لمعرفة وسط مجتمع

يساوي قيمة ثابتة أم لا، أما الاختبار البديل في الاختبارات الغير معلمية هو:

- (أ) اختبار t للعينات المستقلة independent sample T Test
 (ب) اختبار الإشارة Sign Test
 (ج) **مان وتني Mann Whitney** **المحاضرة الثالثة عشر 131**
 (د) كروسكال والز kruskal Wallis

(4) يرغب أحد مدراء إحدى المصانع في تقدير متوسط عدد الدقائق التي يأخذها العمال لإنجاز عملية صناعية معينة بحيث لا يتعدى الخطأ في تقدير متوسط الأداء في حدود $3 \pm$ دقيقة وبدرجة ثقة 90%. ويعلم المدير من خبرته الماضية أن الانحراف المعياري σ هو 15 دقيقة، فإن حجم العينة

الذي يحتاجه المدير لتقدير عدد الدقائق بشكل دقيق مقرباً لأقرب عدد صحيح هو:

(أ) 62

(ب) 64

(ج) 66

(د) 68 المحاضره الثامنه 68

(5) إذا كان من المعلوم أن عدد الوحدات التي تستهلكها الأسرة من سلعة معينة خلال الشهر تتبع توزيع

بواسون بمتوسط 3 وحدات شهرياً، وإذا عرّف المتغير العشوائي X بأنه عدد الوحدات التي تستهلكها

الأسرة خلال الشهر من هذه السلعة، ما احتمال أن أسرة ما تستهلك 3 وحدات على الأكثر خلال الشهر؟

(أ) 0.3474

(ب) 0.4685

(ج) 0.5447

(د) 0.6474 المحاضره الرابعه 37

(6) لو كانت لدينا عينة عشوائية تتكون من 250 طالب وجد أن الوسط الحسابي لأطوال طلاب العينة يبلغ 155.95 سم، والانحراف المعياري = 2.94 سم، علماً بأن الوسط الحسابي لأطوال طلاب الجامعة

158 سم، فإن قيمة المختبر الإحصائي t والمستخدمه لاختبار أهمية الفرق المعنوي بين الوسط الحسابي

لأطوال طلاب العينة والوسط الحسابي لأطوال طلاب الجامعة تساوي:

(أ) 11.006 المحاضره الحاديه عشر الجزء (1) 90

(ب) 12.006

(ج) 13.006

(د) 14.006

(7) إذا كانت لدينا البيانات التالية:

$U = \{1,2,3,4,5,w,x,y,z\}$ و $B = \{3,4,5,x,w\}$ وكانت المجموعة الكلية $A = \{1,2,3,x,y\}$

من خلال البيانات السابقة فإن قيمة $A \cup B$ تساوي:

(أ) $A \cup B = \{1,2,3,4,5,x,y,w\}$ المحاضره الأولى 4(ب) $A \cup B = \{3,4,5,x,y,w\}$ (ج) $A \cup B = \{1,2,3,4,5\}$ (د) $A \cup B = \{1,2,3,4,5,x,y,w,z\}$

(8) من خلال البيانات السابقة $A \cap B$ تساوي:

(أ) $A \cap B = \{3,x\}$ المحاضره الأولى 4

$$A \cap B = \{4, x\} \quad (\text{ب})$$

$$A \cap B = \{3, y\} \quad (\text{ج})$$

$$A \cap B = \{4, w\} \quad (\text{د})$$

إذا كان لديك المخرجات التالية:

Ranks			
	VAR00003	N	Mean Rank
VAR00001	1.00	10	16.90
	2.00	10	12.20
	3.00	10	17.40
	Total	30	

Test Statistics^{a,b}

	VAR00001
Chi-Square	2.140
df	2
Asymp. Sig.	.343

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: VAR00003

(9) من هذه البيانات، نجد أن القرار الإحصائي هو:

(أ) قبول الفرض البديل

(ب) قبول الفرض الصفري

(ج) رفض الفرض الصفري

(د) عدم القدرة على اتخاذ قرار

المحاضره الثالثه عشر 134

(10) الحادثة $A = \{ (x,y) : x + y = 7 \}$ تعني :

(أ) $A = \{ (1,6), (3,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) \}$

(ب) $A = \{ (1,6), (2,5), (4,4), (4,3), (5,2), (6,1) \}$

(ج) $A = \{ (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,3), (6,1) \}$

(د) $A = \{ (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) \}$ المحاضره الثانيه الجزء (1) 14

(11) $A = \{ a, b, c, d \}$ تعني:

(أ) أن المجموعة A تتكون من العناصر b و c و d

(ب) أن المجموعة A تتكون من العناصر a و b و c و d

(ج) أن المجموعة A تتكون من العناصر a و c و d

(د) أن المجموعة A تتكون من العناصر a و b و c

المحاضره الأولى 2

- (12) المجموعتان المتساويتان هما المجموعتان اللتان:
- (أ) تتساويان في عدد عناصرهما أي عدد عناصر A يساوي عدد عناصر B
- (ب) يكون كل عنصر من المجموعة A ينتمي ويساوي العنصر في المجموعة B والعكس
- (ج) يكون كل عنصر من المجموعة A ينتمي ولا يساوي العنصر في المجموعة B والعكس
- (د) تكون عناصرها غير محددة

المحاضرة الأولى الجزء (1) 4

- (13) اختبار إحصائي يستخدم لقياس مدى الفارق والتباين بين أكثر من متوسطين:

- (أ) اختبار t
- (ب) اختبار Jama
- (ج) اختبار ANOVA
- (د) تحليل الانحدار

المحاضرة الثانية عشر الجزء (1) 103

- (14) القيمة الحرجة (نقطة القطع العليا) للمتغير العشوائي t عندما تكون درجات الحرية 20 ومستوى الدلالة

0.95 تساوي:

(أ) 0.860

(ب) 1.064

(ج) 1.325

(د) 1.725

المحاضرة الخامسة 48

- أراد باحث أن يعرف أثر استخدام نظم مساندة القرارات على كفاءة القرارات التي تتخذها الإدارة بمساعدة تلك النظم، فوزع 50 مديرا لمنشآت صناعية عشوائية في مجموعتين، ثم عين أحدهما بطريقة عشوائية لتكون مجموعة تجريبية والأخرى ضابطة، وفي نهاية التجربة وزع على المجموعتان استقصاء يقيس درجة فاعلية القرار وكفاءته عندما يتم اتخاذه باستخدام نظم مساندة القرارات بدلا من الطريقة التقليدية فكانت النتائج كما يلي:

المجموعة الضابطة	المجموعة التجريبية
$25 = \bar{X}_1$	$25 = n_1$
$6.0 = n_2$	$7.60 = S_1^2$
$1.78 = S_2^2$	$2.27 = \bar{X}_2$

- (15) من خلال الجدول السابق، هل تدل البيانات على أن أداء المجموعة التجريبية كان أفضل من أداء

المجموعة الضابطة عند مستوى $\alpha = 0.05$ ؟

(أ) المجموعة الضابطة أداؤهم أفضل في عملية اتخاذ القرار من المجموعة التجريبية

- (ب) المجموعة التجريبية أداءهم أفضل في عملية اتخاذ القرار من المجموعة الضابطة
(ج) كلا المجموعتين أداءهم متساوي
(د) البيانات المتوفرة ليست كافية لاتخاذ قرار بهذا الخصوص.
- (16) إذا كان مستوى المعنوية في مشكلة معينة يساوي 0.05 ، وأن حجم العينة يساوي 20 ، فإن قيمة T الحرجة التي تناظر اختبار ذو طرفين تساوي:
- (أ) 1.729
(ب) 2.093 (المحاضرة الحادية عشر الجزء (1) 85)
(ج) 2.539
(د) 2.845
- (17) قذفت قطعة نقود معدنية ثلاث مرات، فإن فراغ هذه العينة Ω يساوي:
- (أ) $\Omega = \{(HHH), (THT), (HTH), (HTT), (THH), (THT), (TTH), (TTT)\}$
(ب) $\Omega = \{(HHH), (HHT), (HTH), (TTT), (THH), (THT), (TTH), (TTT)\}$
(ج) $\Omega = \{(HHH), (HHT), (HTH), (HTT), (THH), (HHT), (TTH), (TTT)\}$
(د) $\Omega = \{(HHH), (HHT), (HTH), (HTT), (THH), (THT), (TTH), (TTT)\}$
- (18) إذا كانت قيمة معامل الارتباط تساوي 0.90 فإن معامل التحديد يساوي:
- (أ) 0.45
(ب) 0.81
(ج) 0.90
(د) 1.8
- (19) التجربة العشوائية Random Experiment هي:
- (أ) التجربة التي تكون جميع نتائجها معلومة مسبقا ولا يمكن التنبؤ بحدوث أي من هذه النتائج بصفة مؤكدة
(ب) التجربة التي تكون جميع نتائجها غير معلومة مسبقا ولا يمكن التنبؤ بحدوث أي من هذه النتائج بصفة مؤكدة
(ج) التجربة التي تكون جميع نتائجها معلومة مسبقا ويمكن التنبؤ بحدوث أي من هذه النتائج بصفة مؤكدة
(د) التجربة التي تكون جميع نتائجها غير معلومة مسبقا ويمكن التنبؤ بحدوث أي من هذه النتائج بصفة مؤكدة
- (20) في جامعة الملك فيصل اختيرت عينة من 200 طالب، كان عدد المنتسبين بها 50 طالب، قدر نسبة الطلاب المنتسبين في الجامعة بدرجة ثقة 95%. فإن نسبة المنتسبين في الجامعة P تقع بين القيمتين:
- (أ) .,29 ، .,37
(ب) .,19 ، .,31 (المحاضرة التاسعة 74)
(ج) .,17 ، .,27
(د) .,18 ، .,21