



حل أسئلة الإحصاء الفصل الثاني 1436

إعداد:

Predominant



1. الانحراف الربيعي يساوي

- (أ) ضعف الربيعي
(ب) نصف الربيعي
(ج) المدى
(د) المدى

2. للمنحنيات التكرارية

بداية المنوال وبسيطة الالتواء يكون :

- (أ) الوسط
(ب) المنوال
(ج) الوسط
(د) الوسط
- $ل = 3 \times (\text{الوسط} - \text{الوسط})$
 $ط = 3 \times (\text{المنوال} - \text{الوسط})$
 $ط = 3 \times (\text{الوسط} - \text{المنوال})$
 $ال = 3 \times (\text{الوسط} - \text{الوسط})$

3. أحد مقاييس النز


كزية الذي قد يمكن تحديده للبيانات النوعية :

- (أ) الوسط الحسابي
(ب) المنوال
(ج) الوسط
(د) المدى

4. شكل الانتشار الم

يوضح أن المتغيرين x, y :

- (أ) مرتبطان ارتباطاً قوياً
(ب) مرتبطان ارتباطاً قوياً
(ج) غير مرتبطين
(د) مرتبطان ارتباطاً طردياً تاماً



5. إذا كان معامل الارتباط

بين المتغيرين x, y يساوي 1 فهذا يعني :

- (أ) مرتبطان ارتباطاً عكسياً تاماً
(ب) مرتبطان ارتباطاً طردياً تاماً
(ج) مرتبطان ارتباطاً عكسياً قوياً
(د) مرتبطان ارتباطاً طردياً قوياً

6. الوسط لمجموعة القيم : 4 ، 9 ، 8 ، 5 ، 4 ، هو :

- (أ) 8
(ب) 5
(ج) 4
(د) 6

7. الوسط الحسابي لـ

القيم : 16 ، 4 ، 8 ، 2 ، 3 ، 9 ، هو :

- (أ) 6
(ب) 8
(ج) 7
(د) 5

8. إذا كان الوسط الحسابي لدرجات عدد من الطلاب هو 100 وانحرافها المعياري 10 ، فإن معامل الاختلاف للدرجات يكون

- (أ) 0.1
(ب) 10% ✓
(ج) 0.5
(د) 50%

9. الدرجة المعيارية للقيمة 6 في مجموعة من القيم وسطها الحسابي 5 وتباينها 4 هي :

- (أ) -0.5 ✓
(ب) -2
(ج) 2
(د) 0.5

10. إذا كان المدى الربيعي لتوزيع ما 10 والمدى المنيني لهذا التوزيع 50 ، فإن معامل التفرطح المنيني لهذا التوزيع يساوي :

- (أ) 0.1 ✓
(ب) 10
(ج) 5
(د) 0.2

خاص بالأسئلة من (11) إلى (15)

في الجدول التكراري المبين [غير مهم البيانات المرصود لها] ، إذا كان d يمثل الانحراف [لكل قيمة x] عن الوسط الحسابي ، فإن :

x	f	fx	d	$ d $	$f d $	d^2	fd^2
.....							
.....							
.....							
2							
$\sum f = 100$		$\sum fx = 450$			$\sum f d = 185$		$\sum fd^2 = 475$

11. الوسط الحسابي السابقة هو :

- (أ) 4.5 ✓
(ب) 1.85
(ج) 2.18
(د) 4.75

12. الانحراف المتوسط للبيانات السابقة هو :

- (أ) 4.5
(ب) 1.85 ✓
(ج) 2.18
(د) 4.75

13. التباين للبيانات السابقة هو :

- (أ) 4.5
(ب) 1.85
(ج) 2.18
(د) 4.75

14. الانحراف المعياري للبيانات السابقة هو (تقريباً) :

- (أ) 4.5
(ب) 1.85
(ج) 2.18
(د) 4.75

15. $\sum fd$ يساوي :

- (أ) 185
(ب) 0
(ج) 475
(د) 450

خاص بالأسئلة من (16) إلى (19)

إذا كان الوسط الحسابي للقيم هو 20 وانحرافها المتوسط 4 وانحرافها المعياري 5 وضربنا كل قيمة من القيم في -2 ، فإن

16. الوسط الحسابي للقيم الجديدة يكون :

- (أ) 22
(ب) 40
(ج) -40
(د) 18

17. الانحراف المتوسط للقيم الجديدة يكون :

- (أ) -8
(ب) 2
(ج) 4
(د) 8

18. الانحراف المعياري للقيم الجديدة يكون :

- (أ) 3
(ب) 5
(ج) 10
(د) -10

19. التباين للقيم الجديدة يكون :

- (أ) 100 ✓
(ب) 25
(ج) 5
(د) -100

خاص بالأسئلة من (20) إلى (22)

مجموعة من القيم عددها 10 ولها البيانات التالية :

$$\sum x = 60, \quad \sum |d| = 22, \quad \sum d^2 = 76$$

حيث $\sum x$ هو مجموع القيم ، d هو الانحراف عن الوسط الحسابي للقيم ، $|d|$ هو القيمة المطلقة لهذا الانحراف
إذن :

20. الوسط الحسابي للبيانات السابقة هو :

- (أ) 2.2
(ب) 7.6
(ج) 6 ✓
(د) 2.76

21. الانحراف المتوسط للبيانات السابقة هو :

- (أ) 2.2 ✓
(ب) 7.6
(ج) 6
(د) 2.76

22. التباين للبيانات السابقة هو :

- (أ) 2.2
(ب) 7.6 ✓
(ج) 6
(د) 2.76

خاص بالأسئلة من (23) إلى (26)

المتغير (العمر) x	التكرار (العدد)	الزاوية المركزية
20	20	72°
25	?	36°
30	30	?
35	?	?
Σf		

جدول يبين أعمار عدد من
العاملات في إحدى
المؤسسات (لأقرب سنة)

من الجدول (التوزيع) التكراري السابق :

23. عدد العاملات ذات العمر 25 سنة هو :

- (أ) 10
(ب) 20
(ج) 30
(د) 40

24. الزاوية المركزية المناظرة للعمر 30 سنة تساوي

- (أ) 36°
(ب) 72°
(ج) 108°
(د) 144°

25. عدد العاملات الكا أي مجموع التكرارات هو


- (أ) 95
(ب) 100
(ج) 105
(د) 110

26. المدى R للعمر هو :

- (أ) 5
(ب) 10
(ج) 15
(د) 20

خاص بالأسئلة من (27) إلى (31)

من المدرج التكراري التالي :



مدرج تكراري يوضح الدرجة x لعدد من الطلاب في مقرر مبادئ الإحصاء مقسمين على 4 فئات

27. العدد الكلي للطلاب

- (أ) 60
(ب) 90
(ج) 110
(د) 130 ✓

28. عدد الطلاب الراغبين في الحصول على درجة أقل من 60 :

- (أ) 45
(ب) 50
(ج) 55
(د) 60 ✓

29. عدد الطلاب الحاصلين على 80 فأكثر :

- (أ) 20 ✓
(ب) 25
(ج) 30
(د) 35

30. عدد الطلاب الحاصلين على تقدير C+ [أكثر من 75 وأقل من 80] :

- (أ) 40
(ب) 30
(ج) 20
(د) 10 ✓

31. هو العلم الذي يبحث في استقرار النتائج واتخاذ القرارات

- (أ) علم الإحصاء الوصفي
(ب) علم الإحصاء الاستقرائي
(ج) علم تقني ومات
(د) علم تكدي المعلومات

32. هي الدلالات عن تلك
إيجاد قيم لمقاييس لتحديد قيمها من البيانات بظاهرة معينة وتُعطى بعض

- (أ) جمع البيانات
(ب) تنظيم و
(ج) تحليل واستقرار
(د) واتخاذ القرارات

33. المسافات التي لها شخص خلال ساعات يوم معين

- (أ) متغير نوعي
(ب) متغير كمي متقطع
(ج) متغير كمي متصل
(د) ليس من الإطلاق

34. البيانات المجمعة [أو ماركات] السيارات في أحد المواقف هي

- (أ) بيانات
(ب) بيانات قطعة
(ج) بيانات متصلة
(د) ليست بـ على الإطلاق

35. المدى R لمجموعة البيانات هو :

- (أ) أكثر القيم تكراراً في البيانات
(ب) أكبر قيمة في البيانات
(ج) أصغر قيمة في البيانات
(د) الفرق بين أكبر وأصغر قيمة من البيانات

36. للبيانات الكمية المتصلة يكون التكرار النسبي لأي فئة من الفئات

- (أ) النسبة بين الأعلى للفئة ومجموع التكرارات
(ب) خارج فئة الفئات على طولها
(ج) نسبة تكرار الفئة إلى مجموع التكرارات
(د) النسبة بين الأدنى للفئة ومجموع التكرارات

37. عند تمثيل مجموعة القيم بطريقة الدائرة تكون الزاوية المركزية هي :

- (أ) القيمة - مع القيم $360 \times$
(ب) تكرار القيمة 360
(ج) تكرار القيمة 360
(د) التكرار للقيمة $360 \times$

38. في طريقة المضاة التكراري لعرض البيانات المنفصلة تمثل كل قيمة من قيم المتغير بـ :

- (أ) عمود (ب) قضيب (ج) نقطة (د) قطاع
- (أ) أسدي طوله يُعبر عن تكرار تلك القيمة .
(ب) أفقي طوله يُعبر عن تكرار تلك القيمة .
(ج) لها هي قيمة المتغير وتكرارها
(د) طبقاً لتكرارها .

39. في المدرج التكراري بيانات متصلة ذات فئات غير متساوية يكون ارز في مستطيل من المستطيلات هو

- (أ) تكرار (ب) التكرار (ج) كثافة (د) طول
- (أ) تي يمثلها المستطيل
(ب) اللفنة التي يمثلها المستطيل
(ج) لفنة التي يمثلها المستطيل
(د) في يمثلها المستطيل

40. مقاييس التشتت هي

- (أ) قيم نموذجية يمكن أن تمثل مجموعة البيانات
(ب) مقاييس ترصد الدرجة التي تتجه بها البيانات الكمية للانتشار حول قيمة متوسطة
(ج) مقاييس تحدد النسبة المئوية للتشتت المطلق بالنسبة لقيمة متوسطة
(د) هي مقاييس تصد درجة تماثل أو البعد عن التماثل لتوزيع ما

41. الوسيط هو أحد

- (أ) النزعة (ب) التشتت (ج) الالتواء (د) التفرط

42. الانحراف المتوسط أحد مقاييس

- (أ) النزعة (ب) التشتت (ج) الالتواء (د) الارتباط

43. معامل الاختلاف يعي هو أحد مقاييس

- (أ) النزعة (ب) التشتت (ج) الالتواء (د) التشتت

44. في المنحنى الملتهب لليمين يكون

- (أ) الوس من المنوال (ب) الوس من المنوال (ج) المنوال من الوسط (د) الوسط من المنوال

45. لعدد من القيم ، يُعرّف توسط مربعات انحرافات القيم عن الوسط الحسابي لها على أنه
- (أ) الوسط الحسابي
(ب) الانحراف المعياري
(ج) ☒ تباين تلك القيم
(د) الانحراف المعياري للقيم
46. هو قيمة تقسم مجزأة القيم [بعد ترتيبها تصاعدياً] إلى مجموعتين بحيث تقع 75% من القيم تحتها (أي أقل منها) ، 25%
- (أ) الربع الأول
(ب) الوسيط
(ج) ☒ الربع الثالث
(د) المئين الخامس
47. الدرجة المعيارية لقيمة ما تساوي
- (أ) [القيمة - الانحراف المعياري] ÷ الوسط الحسابي
(ب) ☒ [القيمة - الوسط الحسابي] ÷ الانحراف المعياري
(ج) [الانحراف المعياري - الوسط الحسابي] ÷ القيمة
(د) [الوسط الحسابي - الانحراف المعياري] ÷ القيمة
48. الربع الأول لمجموعة من القيم هو نفسه
- (أ) ☒ المئين الخامس
(ب) المئين الثاني
(ج) نصف القيم
(د) الوسيط
49. الوسيط لمجموعة من القيم هو نفسه
- (أ) الربع الأول
(ب) الربع الثالث
(ج) ☒ نصف الوسيط
(د) المئين الخمسون
50. مقياس يمكن حسبه توزيعات المفتوحة :
- (أ) ☒ الانحراف المعياري
(ب) المدى
(ج) ☒ الوسيط
(د) الوسط الحسابي

مع التمنيات الطيبة بالتوفيق
د. سعيد سيف الدين